

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse
Alpelisiib	Kasvajavastane ravi	hoiatus: rifampitsiin vähendab alpelisiibi AUC'd olulisel määral, väheneb alplesiibi efektiivsus; sama risk on apalutamiidi, karbamasepiini, ensalutamiidi, mitotaani, fenütoiini või naistepunaga koosmanustamisel
Amivantamab	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: hüpoglükeemia, hüpomagneseemia (sage)
Donepesiil	Alzheimeri tõvega seotud dementsuse ravi	hoiatus: unehäirete, sh ebanormaalsete unenägude ja õudusunenägude või unetuse korral tuleb kaaluda ravimi võtmist hommikuti kõrvaltoime: libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, pleurototoonus (Pisa sündroom - lihaste tahtmatud kokkutõmbed koos keha ja pea ebanormaalse paindumisega ühele küljele)
Edotreotiid	Radiodiagnostikum	hoiatus ja kõrvaltoime: gallium (68Ga) edotreotiidi füsioloogiline omastamine põrnakoes võib anda valediagnoosiks neuroendokriintuumori, viies ebavajaliku sekkumiseni
Erlotiniib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: hepatiit, äge hepatiit ja soole pneumatoos
Hüdromorfoon	Valu ravi	hoiatus: opioidide tarvitamise häire, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Idebenoon	Nägemiskahjustuse ravi Leberi päriliku optilise neuropaatia korral	hoiatus: maksakahjustusega patsientidel on teatatud kõrvaltoimetest, mille tõttu on ravi ajutiselt peatatud või lõplikult katkestatud
Kabosantiniib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: pneumotooraks, kutaanne vaskuliit
Luteetsium (177Lu) oksodotreotiid	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem
Osimertiniib	Kasvajavastane ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: aplastiline aneemia (patsiendile tuleb selgitada nähte, nende tekkel tuleb ravi lõpetada), südamepuudulikkus, vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni vähenemine
Ravulizumab	Müasteenia ravi	hoiatus: kui pärast ravi lõpetamist tekivad generaliseerunud müasteenia sümptomid, tuleb kaaluda ravi uuesti alustamist ravulizumabiga. Patsientidele, kellel ekulizumabi heakskiidetud raviskeemile ravivastust ei teki, ei ole ravi ravulizumabiga soovitatav
Roksadustaat	Aneemia ravi kroonilise neeruhaiguse korral	kõrvaltoimed: sekundaarne hüpotüreos, kilpnääret stimuleeriva hormooni sisalduse langus veres
Spikevax (COVID-19 vaktsiin)	Immuniseerimine	kõrvaltoime: vaksineeritud jäseme ulatuslik turse

Sufentaniil	Ägeda valu ravi	hoiatus: hüperalgeesia, hingamishäirete, sõltuvuse risk, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Tapentadool	Valu ravi	hoiatus: opiidide tarvitamise häire, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Vildagliptiin	2. tüüpi suhkurtõve ravi	kõrvaltoime: naha vaskuliit