

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse
Adenosiin	Südame rütmihäirete ravi	kõrvaltoime: koronaararterite spasm , mis võib viia müokardiinfarkti
Alemtuzumab	Hulgiskleroosi ravi	vastunäidustus: anamneesis pea- ja kaelaarterite dissektsioon kõrvaltoime: koldeline alopeetsia
Amlodipiin	Hüpertensiooni, stenokardia ravi	üleannustamine: amlodipiiniga üleannustamise tagajärjel on harva tekkinud mittekardiogeenne kopsuturse, mis võib avalduda viivitusega (24...48 tundi pärast manustamist) ja vajada hingamise toetamist. Esilekutsuvateks teguriteks võivad olla varased elustamismeetmed (sh liigne vedelikukoormus) perfusiooni ja südame väljutusmahu säilitamiseks kõrvaltoime: hüpotensioon
Atezolisumab	Kasvajavastane ravi	hoiatus: 1. või 2. raskusastme näonärvihalvatuse korral tuleb ravi atesolisumabiga katkestada ja kaaluda ravi süsteemsete kortikosteroididega (1...2 mg/kg kk/ööpäevas prednisooni või ekvivalenti). Ravi tohib uuesti alustada ainult kõrvaltoime täieliku lahenemise korral. Ravi atesolisumabiga tuleb alaliselt lõpetada 3. või 4. raskusastme näonärvihalvatuse või mis tahes muu neuropaatia korral, mis ei parane täielikult atesolisumabi ravikatkestuse ajal. kõrvaltoimed: suukuivus, näonärvi halvatus, müeliit
Idekabtageenvikleutseel	Hulgimüeloomi ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: lisaks muudele neuroloogilistele häiretele (motoorsele düsfunktsioonile) on teatatud on ka hilise algusega 3. astme parkinsonismist
Lenvatiniib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: neerupealiste puudulikkus
Midasolaam (eelkõige parenteraalne ravimvorm)	Sedatsioon	kõrvaltoime: Kounise sündroom
Midasolaam (suuõõne lahus)	Epilepsia ravi	kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
Naltreksoon/bupropioon	Kehakaalu langetamine	hoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP) Patsiente tuleb nahareaktsioonide nähtudest ja sümptomitest teavitada ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgida. Sellistele reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite ilmnemisel tuleb ravi naltreksooni/bupropiooni viivitamatult lõpetada ning kaaluda vajaduse korral muud ravi. Kui patsiendil on naltreksooni/bupropiooni kasutamisel tekkinud tõsine nahareaktsioon, siis ei tohi sellel patsiendil ravi enam uuesti alustada

Pantoprasool	Gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi	hoiatus: pantoprasooli kasutamisel on patsientidel saadud mõningate tetrahüdrokannabinooli (THC) suhtes skriinimise uriinianalüüsides valepositiivseid tulemusi. Positiivsete tulemuste kinnitamiseks tuleb kasutada muud meetodit kõrvaltoime: Lyelli sündroom (TEN) , ravimi reaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
Ponesimood	Hulgiskleroosi ravi	kõrvaltoime: krambihoog
Pralsetiniib	Kasvajavastane ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: ravi saavatel patsientidel on teatatud tuberkuloosist, peamiselt ekstrapulmonaalsest (lümfisõlmede, peritoneaalne või neerutuberkuloos). Enne ravi alustamist tuleb patsiente hinnata aktiivse ja inaktiivse (latentse) tuberkuloosi suhtes vastavalt kohalikele soovitudele. Aktiivse või latentse tuberkuloosiga patsiendid peavad enne ravi alustamist saada standardset mükobakteritevastast ravi
Tenofoviir	B-hepatiidi ravi	hoiatused: mõnel 6 aastasel või vanemal vähemalt 25 kg kaaluval patsiendil, kellele manustati tenofoviiralafenamiidi 48 nädala jooksul, esines lülisamba nimmepeirkonna ja kogu keha luu mineraalse tiheduse vähenemist ($LMT \geq 4\%$). LMT muutuste pikaajalised mõjud kasvavale luule, sealhulgas luumurdude tekke riskile, ei ole teada. Asjakohase jälgimise üle otsustamisel ravi ajal on soovitatav kasutada multidistsiplinaarset lähenemisviisi. Avaldatud andmete põhjal erituvad tenofoviiralafenamiid ja tenofoviir vähesel hulgal rinnapiima. Andmed tenofoviiri toimest vastsündinutele/imikutele on puudulikud. Riski rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele ei saa välistada, seetõttu ei tohi tenofoviiralafenamiidi kasutada rinnaga toitmise ajal
Tsemitlimab	Kasvajavastane ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsüstoos (HLH). Patsiente tuleb jälgida HLH kliiniliste nähtude ja sümptomite suhtes. HLH kinnitumisel tuleb lõpetada tsemitlimabi manustamine ja alustada HLH ravi
Vemurafenib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: trombotsütopeenia