

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse
Alfasebelipaas	Ainevahetushaiguse ravi	kõrvaltoime ja hoiatused: immunogeensus - patsientidel on tekkinud alfasebelipaasi vastaseid antikehi. Imikutel on laste ja täiskasvanutega võrreldes täheldatud ravimivastaste antikehade suuremat esinemissagedust. Andmeid on vähe, et teha järeldusi neutraliseerivate antikehade tekke ja seotud ülitundlikkusreaktsioonide või suboptimaalse kliinilise ravivastuse vahelise seose kohta. Pearinglus - võib mõjutada autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet
Baritsitiniib	Reumatoidartriidi, atoopilise dermatiidi ravi	kõrvaltoimed: kõhuvalu, peavalu
Bendamustiin	Kasvajavastane ravi	hoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhud (sh surmaga lõppenud) pärast rituksimabi või obinutusumabi kombinatsiooni kasutamist; mittemelanoomset tüüpi nahavähi (basaalrakuline kartsinoom ja lamerakk-kartsinoom) suurenenud risk (täheldati kliinilistes uuringutes) - nahavähi riskifaktoritega patsientidel on soovitatav teha perioodiliselt nahauuringuid
Brivaratsetaam	Epilepsia ravi	koostoime: kannabidiooli samaaegne kasutamine võib suurendada brivaratsetaami plasmataset, mida võib põhjustada CYP2C19 inhibeerimine (piiratud kliinilised andmed, kliiniline olulisus on ebaselge)
Busulfaan	Kasvajavastane ravi	koostoime: busulfaani ja deferasiroksi koosmanustamisel on täheldatud busulfaani plasmataset suurenemist. Soovitatav on regulaarselt jälgida busulfaani plasmataset ja vajadusel kohandada busulfaani annust
Dabrafeniib / trametiniib	Kasvajavastane ravi	hoiatus: sarkoidoos - dabrafeniibi ja trametiniibi kombinatsioonravi saanud patsientidel on teatatud sarkoidoosi juhtudest, mis enamasti hõlmab nahka, kopse, silmi ja lümfisõlmi. Oluline on mitte pidada sarkoidoosi haiguse süvenemiseks ja vastavalt ravida
Dolutegraviir	HIV infektsiooni ravi	hoiatus: dolutegraviir eritub rinnapiima väikeses koguses, mõju imikule ei ole teada. HIV infektsiooniga naistel soovitatakse mitte mingil tingimusel last rinnaga toita, et vältida HIV ülekannet
Fenüülefriin (silmaravimina) 10%	Müdiaasi tekitamine	vastunäidustus: alla 12-aastased lapsed (tõsiste süsteemsete kõrvaltoimete oht). 12-18-aastaste laste kohta andmed puuduvad – ravimit ei soovitata neil kasutada neil
Flutikasoon (laktoosi sisaldavad preparaadid)	Astma profülaktika, KOK ravi	vastunäidustus: raske piimavalguallergia
Ibrutiniib	Kasvajavastane ravi	hoiatus: (krooniline) E-hepatiit - patsiente jälgida palaviku, maksatalitluse häirete, neutroopenia ja infektsiooni suhtes, vajadusel rakendada infektsioonivastast ravi vastavalt näidustusele
Jopadimool	Radiofarmatseutikum	kõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid (sh Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos), hemipleegia, Kounise sündroom
Kondrotsüütide sferoidid (Spherox)	Liigesekõhre kahjustuste ravi	kõrvaltoimed: tselluliit, osteomüeliit, infektsioosne artriit, artrofibroos, osteofüütide moodustumine, pneumoonia (kirurgilise protseduuriga seotud)

Lamotrigiin	Epilepsia ravi	hoiatus: fotosensitiivsusreaktsioonid suure annuse korral (>400 mg) pärast annuse suurendamist või kiiret ülestiitrimist
Lenvatiniib	Kasvajavastane ravi	hoiatus: lõualuu osteonekroos - ettevaatus vajalik, kui lenvatiniibi kasutatakse koos antiresorptiivse ravi ja/või teiste angiogeneesi inhibiitoritega või pärast neid. Enne ravi lenvatiniibiga tuleb kaaluda hammaste kontrollimist ja sobivat ennetavat hambaravi (invasiivsed stomatoloogilised protseduurid on riskiteguriks). Patsientidel, kes on varem saanud või saavad intravenoosseid bisfosfonaate, tuleb võimaluse korral vältida invasiivseid stomatoloogilisi protseduure
Metreleptiin	Lipodüstroofia ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: autoimmuunhaiguste , sh raske autoimmuunse hepatiidi progressseerumist/ägenemist on täheldatud mõnedel patsientidel, kuid põhjuslikku seost ei ole tõestatud. Autoimmuunhaigusega patsientidel tuleb hoolikalt kaaluda metreleptiinravi võimalikku kasu ja riske
Naltreksoon/bupropioon	Kehakaalu langetamine	kõrvaltoime: kutaanne erütematoosne luupus koostoime: digoksiini plasmataase võib väheneda naltreksooni/bupropiooni samaaegsel manustamisel. Naltreksooni/bupropiooni kasutamise lõpetamisel võib digoksiini kontsentratsioon tõusta (patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiini mürgistuse suhtes)
Nilotiniib	Kasvajavastane ravi	koostoime: statiinidega koos või suurendada müopaatia, sh rabdomüolüüsi risk kõrvaltoime: näohalvatus
Patisiraan	Päriliku amüloidoosi ravi	kõrvaltoime: sügelemine
Pirfenidoon	Idiopaatilise kopsufibroosi ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: pirfenidooniga ravitud patsientidel on teatatud hüponatreemiast, mille sümptomid võivad olla tagasihoidlikud ja kaasuvate haiguste poolt varjatud. Seetõttu on soovitatav vastavate laboratoorsete näitajate regulaarne jälgimine, eriti kui esinevad sellele viitavad nähud ja sümptomid, nagu iiveldus, peavalu või pearinglus
Pregabaliin	Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi	hoiatus: hingamise pärssimine (oht suurem respiratoorse või neuroloogilise haiguse, neerukahjustuse, samaaegselt KNS depressiooni põhjustavaid aineid kasutavatel ja eakatel patsientidel)
Sarilumab	Reumatoidartriidi ravi	kõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon (nii divertikuliidiga kui ka divertikuliidita patsientidel)
Tseftriaksoon	Infektsioonivastane ravi	hoiatus: entsefalopaatia, eelkõige raske neerukahjustusega või KNS häiretega eakatel patsientidel. Entsefalopaatia kahtluse korral (nt teadvushäireid, vaimse seisundi muutused, müokloonus, krambid) tuleb kaaluda tseftriaksoonravi peatamist
Voretigeen-neparvovek	Päriliku võrkkesta düstroofia ravi	kõrvaltoime: klaaskeha hägusus