

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse
Belantamabmafodotiin	Hulgimüeloomi ravi	kõrvaltoime: silma (sarvkesta) vähenenud tundlikkus
Ketorolak (süsteemne)	Valu ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: MSPVA-d, sealhulgas ketorolak, võivad olla seotud seedetrakti anastomoosi lekke suurenenud riskiga. Ketorolaki kasutamisel seedetrakti operatsiooni järgselt on soovitatav ettevaatus ja asjakohane jälgimine
Kasirivimab + imdevanib	Covid-19 ravi	kõrvaltoimed: ülitundlikkus, kihelus, tahhüpnos
Meloksikaam	Põletiku ja valu ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: fikseerunud ravimlööve - patsientidel, kellel on anamneesis meloksikaamiga seotud fikseerunud ravimlööve, ei tohi meloksikaamravi uuesti alustada. Esineda võib ristreaktiivsust teiste oksikaamididega
Oksübutüniin (suukaudne)	Tungiinkontinentsi ravi	kõrvaltoime: südamepekslemine
Oksübutüniin (transdermaalne)	Tungiinkontinentsi ravi	hoiatus: plaastrit ei tohi jagada ega tükkideks lõigata. Rikutud plaastrit ei tohi kasutada
Palbotsikliib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: venoosne trombemboolia (sage), palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroom (sage)
Patisiraan	Päriliku amüloidoosi ravi	kõrvaltoime: düsfoonia (infektsiooniga seotud reaktsioon)
Tenofoviir	Kasvajavastane ravi	hoiatus: luu mineraalse tiheduse vähenemine (LMT) - mõnel 6-aastaselt või vanemal vähemalt 25 kg kaaluval patsiendil, kellele manustati tenofoviiralafenamiidi 48 nädala jooksul, esines lülisamba nimmepiirkonna ja kogu keha LMT vähenemist ($\geq 4\%$). LMT muutuste pikaajalised mõjud kasvavale luule, sh luumurdude tekke riskile, ei ole teada. Raviaegse jälgimise üle otsustamisel on soovitatav multidistsiplinaarne lähenemisviis
Vokseletoor	Sirprakulise aneemia ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) - patsiente tuleb teavitada selle nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb tähelepanelikult jälgida nahareaktsioonide suhtes. Neile reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada ja kaaluda mõnda muud ravi. Reaktsiooni tekkimisel ei tohi ravi vokselotooriga taas alustada